



Řez červeného rybízu

Oblíbená bobulovina se v našich zahradách pěstuje většinou v keřové formě. Pás pod keřem je nutno udržovat v bezplevelném stavu, rybíz totiž kořeni mělce a v případě zaplevelení dochází k jeho rychlejšímu stárnutí.

U rybízu je nutný každoroční řez, kterým podpoříme bohatou úrodu, přičemž nejvhodnějším obdobím je únor až duben, řez je možný také po sklizni.

V prvních letech keř řežeme méně, kromě prvního roku, kdy zkrátíme výhony na 1 - 2 pupeny od země, během tří let pak dosáhneme plodnosti. Při řezu nikdy neponecháváme čípky, protože rybíz nevytváří hojivé pletivo a po seříznutí začíná dřevo zasychat, tím vzniká riziko šíření houbových chorob. Nejprve odstraníme všechny suché, napadené či jinak oslabené větve. Dále odstraníme nejstarší větve buď těsně u země nebo zajedeme nůžkami lehce pod povrch půdy. Abychom mohli tímto způsobem rybíz řezat, musíme jej vysadit tak hluboko, aby místo větvení bylo 10 - 15 cm pod povrchem půdy, jen tímto způsobem podpoříme růst nových výhonů ze spících pupenů na kořenech a kořenovém krčku. Jiná situace nastává např. u pěstování rybízu ve formě palmety, kdy keře vysazujeme pouze tak hluboko, aby kořenový bal byl v úrovni povrchu půdy.

V tuto dobu myslíme také na včasnou ochranu proti chorobám a škůdcům, protože většina z nich se právě v tuto chvíli „rozhlíží“ po vhodném hostiteli.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

www.zahradniksikula.cz