

Chcete mít zdravé ovoce na zahradě?

A máme tady, konečně, tolik očekávané jaro. Především my, zahradníci, jsme již netrpělivě vyčkávali na chvíle, kdy se opět budeme moci vrhnout do práce na zahradách a těšit se z letošních výpěstků.

O aplikaci chemických přípravků jsme na stránkách Nového Zebrinu již psali, dnes na toto povídání trochu navážeme. Duben je totiž nejlepší čas, kdy je vhodné aplikovat pesticidy, jako ochranu proti chorobám a škůdcům.

Pro aplikaci jakéhokoliv přípravku si zvolte den, kdy nesvítí prudké slunce a nechystá se déšť. Nemělo by být ani větrno. Při postřiku buďte opatrní, abyste nezasáhli okolní porost.

Strupovitost jabloně

Houbová choroba, která může být pouze vadou na kráse. Spory přezimují na napadených listech a na napadených větvích. Projevuje se nejprve světle hnědými tečkami na listech, pak strupy na plodech. Ošetřuje se ve fázi myšího ouška (fáze, kdy se začínají rozvíjet první lístky) postřik se opakuje po 7 až 10-ti denních intervalech. Použit můžete přípravky Discus, Zato 50 WG, Zdravé jablko, Baycor 25 WP, Novozir. Někdy jako prevence postačí udržovat vzdušnou korunu (pravidelný udržovací řez) a nepřehnojovat dusíkem.

Přezimující škůdci

Mnoho škůdců přečkává zimu a nepříznivé podmínky v kůře stromů. Abyste zabránili škodě, kterou vám na jaře mohou napáchat, je nutný chemický postřik. Opět ve fázi myšího ouška až růžového poupěte postříkujte koruny stromů např. přípravkem Ekol nebo Jarní souprava.

Kadeřavost broskvoní

Listy jsou deformované, zbarvené do červena, při silném napadení list odpadne. Vývoji pomáhá deštivé počasí v době rašení a krátké oteplení nad 10°C. Příznaky kadeřavosti mohou připomínat napadení mšicemi, které ale nenajdeme. První postřik děláme v době, kdy kvetou lísky a pak s odstupem asi 10 dnů ošetření 1 až 2x opakujeme. Použit můžeme např. přípravky Syllit 65 WP nebo Delan 700 WG. Doporučují se především přípravky s vyšším obsahem mědi.

Padlí

Nejčastěji se vyskytující houbová choroba, která přezimuje v pupenech. Projevuje se bílými, moučnatými povlaky na listech, ale i na větvích a plodech. Šíří se, je-li teplo a vlhko, což je právě v tuto dobu.

Jeden až dva týdny před rozkvetem ošetříme rostliny např. přípravkem Baycor 25 WP nebo Sulikol. Pokud padlí zaútočí v době plné vegetace, napadené listy vyhoďte do popelnice, nikdy nedávejte na kompost.

Květopas jabloňový

Brouk a jeho larvičky na jaře vyžírají pupeny (konkrétně vyžírají pestíky a prašníky), vznikají tzv. zapečené květy. Lze aplikovat přípravek Karate nebo Calypso, můžete také instalovat leповé pásy na kmény, které je třeba dle potřeby pravidelně obměňovat.

Rez hrušňová

Není asi hrušně, která by touto houbovou chorobou netrpěla. Projevuje se oranžovými skvrnami na listech s černým středem, na rubu listu se potom objevují výrůstky tzv. aecidie. Hostitelem je jalovec chvojka, příp. jiné druhy jalovců, takže k přenosu spor stačí, když jalovce má váš soused na zahradě. Spory se přenáší až na vzdálenost 2 km. Pro eliminaci škod způsobených rzí je dobrá prevence v podobě včasného postřiku, např. přípravek Baycor 25 WP nebo Dithane DG Neotec. Napadené listy, příp. plody rozhodně nepatří do kompostu.

Mšice

Nejčastěji se vyskytující savý škůdce, kterého nejspíš známe všichni. Jejich přítomnost na zahradě poznáte velmi snadno, listy, především ovocných stromů, jsou deformované, zkroucené a jakmile je otevřete, najdete kolonii mšic. Sají nymfy i dospělci. Mšice vylučují medovici, kterou milují mravenci, proto si je tak opečovávají. Medovice lepí, proto se na list postupně přichytí i spory plísni, takže list je potom leповý a pokrytý černým povlakem. Prvotně se musíte zbavit mravenců, kteří je do korun stromů vynášejí. Instalujte proto včas leповé pásy na kmény. Jakmile se mšice již objeví, aplikujte přípravek Mospilan nebo Pirimor 50 WG. Oba dva fungují velmi dobře a rychle.

Přeji krásné jaro a příjemné okamžiky na vaší zahradě.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

www.zahradniksikula.cz